



La Scuola di Galenica Utifar ha l'obiettivo di diffondere la cultura galenica in modo critico e di fornire al farmacista le conoscenze più innovative in materia di preparazioni.

Le lezioni si svolgeranno sia in aula sia in un laboratorio attrezzato con macchinari e utensili di ultima generazione.

I partecipanti saranno seguiti dalla guida esperta dei docenti dr. Adalberto Fabbriconi, dr. Piero Lussignoli e dr. Pietro Siciliano con la partecipazione della dott.ssa Alessandra Cellupica che proporranno diverse formulazioni supportate da una ricca documentazione scientifica.

I prossimi corsi del 2023

28 e 29 ottobre

Il variegato mondo della galenica veterinaria: gli aspetti legislativi, la REV, le ultime novità e le forme farmaceutiche più richieste.

25 e 26 novembre

Le 50 e più formule officinali di libera vendita per rilanciare o far partire alla grande il proprio laboratorio galenico.

I CORSI PREVEDONO UN MINIMO DI 15 E UN MASSIMO DI 25 PARTECIPANTI

I corsi possono essere frequentati anche solo singolarmente

Sede dei corsi: Roma

Quanto costa ogni singolo corso:

€ 370 per i soci Utifar

€ 470 per i non soci

Info sul sito www.utifar.it oppure inquadra il qr code



**EVENTI
ECM
22.4
CREDITI
PER OGNI CORSO**

Ossitocina topica

nella gestione dell'atrofia vulvovaginale

Pillole di
GALENICA

di Rosalba Lombardo,

L'atrofia vulvovaginale è un disturbo genito-urinario che compare con maggiore frequenza dopo la menopausa e include sintomi come secchezza, irritazione, prurito, bruciore e dispareunia. In post-menopausa, la carenza di estrogeni determina una riduzione del flusso sanguigno e un assottigliamento del tessuto vaginale che perde così elasticità e resistenza. Inoltre, il basso livello di estrogeni può causare una diminuzione del numero di lattobacilli con conseguente aumento del pH vaginale.

L'ossitocina è un ormone di natura proteica che agisce anche come neurotrasmettitore; il suo ruolo principale è quello di stimolare la contrazione uterina e il flusso del latte dal seno. Nel trattamento dell'atrofia vulvovaginale, l'applicazione locale di ossitocina è stata esaminata con risultati molto promettenti per quanto riguarda la riduzione dei principali sintomi legati alla patologia.



GEL VAGINALE OSSITOCINA 100-600 UI/ mL

OSSITOCINA Ph.Eur. ACEF	100-600 UI/mL
CARBOSSIMETILCELLULOSA SALE SODICO E 466	1-2.0 g
GLICEROLO EP 99%	20.0 g
ACIDO LATTICO 80 % E 270	qb a pH 4
PARAOSSIBENZOATO DI METILE FU-Ph.Eur.	0.2 g
ACQUA DEPURATA FU ML 1000	qb a 100.0 mL

MODUS OPERANDI

Portare a fusione WITEPSOL H 15 e TEGO SMO (S. 80) a bagnomaria, continuando ad agitare lentamente. A parte solubilizzare METIMAZOLO nella minima quantità di ACQUA DEPURATA. Levigare con la minima quantità di base lipofila fusa, aggiungere la restante quantità secondo il metodo delle diluizioni progressive e misce-

lare fino ad ottenere composto omogeneo. Mescolare, lasciar raffreddare (fino ad una viscosità ottimale) e versare negli stampi. Lasciare raffreddare e rimuovere eventuali eccessi. Confezionare ed etichettare.

PACKAGING

STAMPI IN STRISCE PER 10 SUPPOSTE DA g 1 ACEF.

IL RUOLO PRINCIPALE DELL'OSSITOCINA È QUELLO DI STIMOLARE LA CONTRAZIONE UTERINA E IL FLUSSO DEL LATTE DAL SENO